

香港常見毒草

山藝科持續訓練資料

1

鉤吻 (*Gelsemium elegans*)

- 別名：斷腸草、胡蔓藤
- 科屬：馬錢科、鉤吻屬
- 含毒地方：全株
- 中毒徵象：
 - 眩暈、腹劇痛、
 - 瞳孔散大、肌肉無力；
- 誤服 **可致命！**



香港四大毒草之一

2

洋金花 (*Datura metel*)

- 別名：白花曼陀羅
- 科屬：茄科、曼陀羅屬
- 含毒地方：種子及花
- 中毒徵象：
 - 口乾、說話及視覺模糊、
 - 可能發疹、發燒、幻覺、昏迷；
 - 惡心、嘔吐亦可能發生；
- 誤服 **可致命！**



香港四大毒草之一

3

馬錢子 (*Strychnos angustiflora*)

- 別名：牛眼馬錢
- 科屬：馬錢科、馬錢屬
- 含毒地方：種子
- 中毒徵象：
 - 頭面僵硬、瞳孔散大、
 - 呼吸急促、抽搐、震顫；
- 誤服 **可致命！**



香港四大毒草之一

4

羊角拗 (*Strophanthus divaricatus*)

- 別名：羊角藤
- 科屬：夾竹桃科、羊角拗屬
- 含毒地方：全株
- 中毒徵象：
 - 惡心、嘔吐腹瀉、喪失胃口、
 - 劇烈腹痛、心律不整、頭痛、
 - 困倦、不安、思睡、神志迷亂；
- 誤服 **可致命！**



香港四大毒草之一

5

四大以外

- 以下是香港四大毒草以外，部份含毒性的植物，以供大家參考。



6

海芒果 (Cerbera)

- 別名：海芒果
- 科屬：夾竹桃科、海芒果屬
- 含毒地方：全株
- 中毒徵象：
 - 噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、手腳麻痺、冒冷汗、呼吸困難等；
 - 嚴重 **可致命！**



7

白花丹 (Plumbago zeylanica)

- 別名：假茉莉
- 科屬：白花丹科、白花丹屬
- 含毒地方：全株
- 中毒徵象：
 - 接觸性皮膚發炎、
 - 誤服引起腹瀉；
 - 嚴重 **可致命！**



8

馬利筋 (Asclepias curassavica)

- 別名：連生桂子
- 科屬：蘿藦科、馬利筋屬
- 含毒地方：全株
- 中毒徵象：
 - 頭暈、嘔吐、腹瀉、四肢冰冷、脈膊不規則、昏迷；
 - 嚴重 **可致命！**



9

馬纓丹 (Lantana camara)

- 別名：五色梅
- 科屬：馬鞭草科、馬纓丹屬
- 含毒地方：枝葉及未熟果實
- 中毒徵象：
 - 頭暈、嘔吐、呼吸急促、昏迷；
 - 嚴重 **可致命！**



10

半邊蓮 (Lobelia chinensis)

- 別名：蛇舌草
- 科屬：桔梗科、山梗菜屬
- 含毒地方：全株
- 中毒徵象：
 - 噁心、嘔吐、頭痛及腹瀉；
 - 血壓下降、昏睡、呼吸困難、心臟麻痺；
 - 嚴重 **可致命！**



11

山指甲 (Ligustrum sinense)

- 別名：山紫甲
- 科屬：木犀科、女貞屬
- 含毒地方：全株
- 中毒徵象：
 - 腹瀉；
 - 嚴重 **可致命！**



12

山菅 (Dianella ensifolia)

- 別名：山菅蘭、老鼠怕
- 科屬：萱草科、山菅屬
- 含毒地方：全株
- 中毒徵象：
 - 腹瀉；
 - 可致呼吸困難；
 - 嚴重**可致命**！



13

蓖麻 (Ricinus communis L.)

- 別名：Castor-oil Plant
- 科屬：大戟科
- 含毒地方：全株、種子尤甚
- 中毒徵象：
 - 令器官衰竭而**死亡**！
 - 中毒後並無解藥！



- 蓖麻籽屬《中醫藥條例》附表二中藥材，零售或批發須申請牌照，否則即屬違法。
- 蓖麻屬《化學武器(公約)條例》管制化學品，若無許可證不得或生產、獲取、儲存或保有毒化學武器，違反即屬犯罪，一經定罪最高可罰款五十萬及監禁五年。

14

聲明

- 以上內容只供參考；
- 如因不適當處理而導致醫療事故，中國香港攀山及攀登總會及本資料的製作小組恕不負責。

15

參考資料

- <http://www.hktree.com>
- <http://www.producegreen.org.hk/hkwildflower>
- http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20130615/00176_145.html

16